

## 1. Introducción

La palabra “álgebra” con la que se designa una parte de las Matemáticas, proviene del término *al-jabr* que aparece en el título de un texto del siglo IX, escrito por el matemático árabe al-Khowarizmi.

Los contenidos y métodos de esta disciplina no han permanecido invariables a lo largo de los tiempos, sino que han estado sometidos a cambios diversos. Así, en sus inicios, el álgebra era el arte de reducir y resolver ecuaciones. Actualmente, el álgebra moderna se centra en el estudio de estructuras (grupos, anillos, ...), pero su punto de arranque proviene de las investigaciones del genial Evariste Galois (1811-1832) sobre la resolución de ecuaciones por radicales.



En la historia del álgebra se suelen distinguir tres períodos bien diferenciados:


- (i) Período retórico, en el que todas las expresiones se escribían utilizando el lenguaje ordinario.
- (ii) Período sincopado, en el que se empezaban a utilizar símbolos y abreviaturas para representar la incógnita, sus potencias y los signos de las operaciones elementales.
- (iii) Período simbólico, en el que se usaban símbolos especiales tanto para la incógnita y sus potencias como para las operaciones y relaciones.


En la clasificación anterior no se incluye un tipo especial de álgebra que se sirve o se ayuda de diagramas para obtener resultados interesantes (expresiones notables, resolución de ecuaciones, ...). Esta *álgebra geométrica* o *álgebra diagramática* parece que se originó en la Escuela Pitagórica (allá por el siglo VI a. C.) y fue dada a conocer por Euclides de Alejandría (ca. 300 a. C.) en el libro II de sus famosos Elementos.




En el libro Al-Jabr wal-Muqabala se incluye la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, y se presentan álgebras.








Este segmento  $x - (a/2)$  es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son  $x - a$  y  $a/2$ . Al proceder al cuadrado de ambos miembros de la ecuación propuesta consta de las fases siguientes:



Entonces, el área del gnomon de la figura siguiente también es  $b$ .




Dicho segmento  $(a/2 - x)$  es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son  $a/2$  y  $x$ . Al proceder al cuadrado de ambos miembros de la ecuación anterior se obtiene:


Esto sólo es posible si  $a/2 > \sqrt{b}$

Si  $a/2 = \sqrt{b}$ , el resultado es que el segmento  $(a/2 - x)$  resultante es  $x$  (véase el esquema).



Entonces, el área del gnomon de la figura siguiente también es  $b$ .






Este segmento  $a/2$  es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son  $(a-x)$  y  $x - (a/2)$ . La hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, lo que produce,

Esto sólo es posible si  $a/2 > \sqrt{b}$   
[si  $a/2 = \sqrt{b}$ ]

Al dividir la ecuación anterior entre  $(a/2)^2$ , se obtiene  $(a-x)^2/(a/2)^2 + (x - (a/2))^2/(a/2)^2 = 1$ . El segmento obtenido es  $x$  (véase el


2. Al Khwarizmi y la solución del segundo grado



En este caso,  $5/2$  es el lado de la hipotenusa,  $x$  es el lado de la recta opuesta y  $5/2$  es el lado de la recta adyacente.

# Álgebra geométrica: notas históricas

Escrito por Vicente Meavilla Seguí (Universidad de Zaragoza)



En el cuadro anterior se observa que el lado del cuadrado ABCD es igual a 8.


1. A partir de él construye un cuadrado como el de la figura adjunta.



En el cuadro anterior se observa que el lado del cuadrado ABCD es igual a 10 (véase la figura adjunta),



Al multiplicar el lado del cuadrado ABCD por el lado del cuadrado anterior se obtiene el resultado de la duplicación del



En el punto D, intersección de los dos gráficos, satisface la relación  $x^3 = 2a^3$ .


$$x^2 = 2y \Rightarrow y = x^2/a \quad (x^2)^2 = 2ax \quad \text{y la hipérbola es equilátera } xy = 2a^2 \Rightarrow x^3 = 2a^3$$

En el punto Q, intersección de los dos gráficos, satisface la relación  $x^3 = 2a^3$ .

$$xy = 2a^2 \quad y = 2a^2/x \quad \left(\frac{2a^2}{x}\right)^2 = 2ax \Rightarrow \frac{4a^4}{x^2} = 2ax \Rightarrow 4a^4 = 2ax^3 \Rightarrow x^3 = 2a^3$$


# Álgebra geométrica: notas históricas

Escrito por Vicente Meavilla Seguí (Universidad de Zaragoza)



$$x^2 = ($$

(b) Dibújese una parábola  $P$  de ecuación  $x^2 = y$  y una hipérbola  $C$  de ecuación  $y^2 = ax$ . El centro de dicha



En función del punto  $A$  intersección de las dos curvas, satisface la ecuación propuesta.


$$x^2 = y \Rightarrow x^4 = ay^2 \Rightarrow x^4 = ax(h - x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^3 + ah - ax = 0 \quad \text{Dibujar artes}$$



Comment ils se résolvent.

Et lors cete racine, ou ligne inconnue se trouve aisement. Car si i'ay par exemple




$\zeta \propto a^2 + b^2$   
ie fais le triangle rectangle NLM, dont le côté LM est égal à  $\zeta$ .

## LIVRE PREMIER.

303

angle, jusques a O , en sorte qu'NO soit égale a NL,

et que la ligne cherchée soit PM. Et il se résout




Et lorsque j'aurai résolue l'équation  $y^2 = a^2 + b^2$ , je pourrai trouver la quantité cherchée [que] =  $b^2$

Este texto de Descartes resuelve la ecuación  $y^2 = a^2 + b^2$  que es equivalente a  $y^2 - a^2 = b^2$ . El resultado es que  $y = \sqrt{a^2 + b^2}$ . Efectivamente, si se tiene  $x^2 = a^2 + b^2$  entonces  $y = x$  y se tendrá que:

V del mismo modo, si contiene  $x^4 = ax^2 + b^2$  entonces  $PM$  será  $x^2$  y se tendrá que:

Este texto de Descartes también se apoya en la proposición 36

des autres.



Este texto de Descartes resuelve la ecuación  $y(y + a) = b^2$

Este texto de Descartes resuelve la ecuación  $z^2 = az - b^2$

$$z = \sqrt{(a/2)^2 + b^2}$$



